







# Parabel zeichnen





Schritt für Schrittanleitungen unter [www.fraengg.ch](http://www.fraengg.ch) → Klasse, GeoGebra)





Funktionsgleichung in ABC-Form	Funktionsgleichung in Scheitelform	Funktionsgleichung in Nullstellenform
$y = 2x^2 - 4x - 6$	$y = 2x^2 - 4x - 6$ $y = 2(x^2 - 2x - 3)$   2 ausklammern $y = 2\left(\underbrace{x^2 - 2x + 1}_{\text{Binom}} - 1 - 3\right)$   quadr. ergänzen $y = 2[(x-1)^2 - 4]$   Binom bilden $y = 2(x-1)^2 - 8$ $S(1 -8), A = 2$	$y = 2x^2 - 4x - 6 = 0 \quad   :2$ $x^2 - 2x - 3 = 0$   faktorisieren od. Formel $(x+1)(x-3) = 0 \quad \rightarrow x_1 = -1 \quad \vee \quad x_2 = 3$ $y = 2(x+1)(x-3) \quad N_1(-1 0), N_2(3 0), A = 2$
<p>mit Wertetabelle zeichnen</p> $y(0) = 2 \cdot 0^2 - 4 \cdot 0 - 6 = -6$ $y(1) = 2 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 - 6 = -8$ $y(2) = 2 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 - 6 = -6$ <p>usw.</p>	<p>mit Scheitel S und Streckfaktor A zeichnen</p>	<p>mit Nullstellen und Streckfaktor A zeichnen</p>
		
<p>Vorteil: funktioniert immer Nachteil: aufwendig</p>	<p>Vorteil: funktioniert immer Nachteil: Scheitelform muss hergeleitet werden</p>	<p>Vorteil: schnell, falls Faktorzerlegung funktioniert Nachteil: funktioniert nicht wenn Nullstellen fehlen!</p>

# Funktionsgleichung aus Punkten berechnen

gegeben	gesucht: $y = Ax^2 + Bx + C$	Ansatz	Vorgehen/Bemerkungen
<p>drei Punkte <math>P(x; y)</math>, <math>Q(x; y)</math> und <math>R(x; y)</math></p>		$y = Ax^2 + Bx + C$	<p>Die x- bzw. y-Koordinaten jedes Punktes in die Funktionsgleichung <math>y = Ax^2 + Bx + C</math> einsetzen. Es entsteht ein Gleichungssystem mit drei Unbekannten. Die Auflösung des Gleichungssystems liefert als Ergebnis die Parameter A, B und C.</p>
<p>die Nullstellen <math>x_1</math> bzw. <math>x_2</math> und <math>P(x; y)</math></p>		$y = A \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$	<p>Die Nullstellen <math>x_1</math> bzw. <math>x_2</math> und die Koordinaten des Punktes P in die Funktionsgleichung <math>y = A \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)</math> einsetzen. Die Auflösung liefert den Parameter A. Danach den Parameter A und die Nullstellen in die Funktionsgleichung <math>y = A \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)</math> einsetzen und den Term ausmultiplizieren.</p>
<p>Scheitel <math>S(x_s; y_s)</math> und <math>P(x; y)</math></p>		$y = A \cdot (x - x_s)^2 + y_s$	<p>Die Koordinaten des Scheitels <math>x_s</math> bzw. <math>y_s</math> und die Koordinaten des Punktes P in die Funktionsgleichung <math>y = A \cdot (x - x_s)^2 + y_s</math> einsetzen. Die Auflösung liefert den Parameter A. Danach den Parameter A und die Koordinaten des Scheitels in die Funktionsgleichung <math>y = A \cdot (x - x_s)^2 + y_s</math> einsetzen, den Term ausmultiplizieren und zusammenfassen.</p>

## Transformation von Funktionen (siehe Frommenwiler auf den Seiten 163 und 164)

Transformationsregel	Graph (Beispiele)	Bemerkungen
$f(x) = x^2$ $g(x) = f(x) + d$	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><math>d = 3</math></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><math>d = -5</math></p>  </div> </div>	<p><b>Verschiebung um <math>d</math> in <math>y</math>-Richtung</b>  <math>d &gt; 0 \rightarrow</math> Verschiebung nach oben  <math>d &lt; 0 \rightarrow</math> Verschiebung nach unten</p> <p><b>Tipp:</b> Kontrolle mit Nullstelle!</p>
$f(x) = x^2$ $g(x) = f(x + b)$	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><math>b = 4</math></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><math>b = -3</math></p>  </div> </div>	<p><b>Achtung!</b>  <math>b</math> wird zuerst im Argument addiert,  erst danach wird quadriert!</p> <p><b>Verschiebung um <math>b</math> in <math>x</math>-Richtung</b>  <math>b &gt; 0 \rightarrow</math> Verschiebung nach links  <math>b &lt; 0 \rightarrow</math> Verschiebung nach rechts</p> <p><b>Tipp:</b> Kontrolle mit Nullstelle!</p>

Transformationsregel	Graph (Beispiele)	Bemerkung
$f(x) = x^2$ $g(x) = c \cdot f(x)$	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;"><math>c = 2</math></p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;"><math>c = 1/2</math></p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;"><math>c = -2</math></p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;"><math>c = -1/2</math></p>  </div> </div>	<p style="text-align: center;"><b>Streckung/ Stauchung um <math>c</math> in <math>y</math>-Richtung</b></p> <p style="text-align: center;"><math>c &gt; 1 \rightarrow</math> Streckung  <math>0 &lt; c &lt; 1 \rightarrow</math> Stauchung</p> <p style="text-align: center;"><math>c &lt; -1 \rightarrow</math> Streckung/Spiegelung  <math>-1 &lt; c &lt; 0 \rightarrow</math> Stauchung/Spiegelung</p>

**Wichtig:** Die Transformationsregeln lassen sich auf alle Funktionen übertragen!

## 15 Quadratische Funktionen (Übungen)

### 15.1 Scheitelform bestimmen (über die Nullstellen)

1. Gegeben sind folgende Funktionen:  $y_1 = \frac{1}{4}x^2 + 2x - 3$  und  $y_2 = \frac{1}{2}x + 1$
- Berechnen Sie die Nullstellen der beiden Funktionen.
  - Berechnen Sie die Koordinaten des Scheitelpunktes der Parabel.
  - Berechnen Sie die Schnittpunkte der beiden Funktionen.
  - Zeichnen Sie die Graphen der beiden Funktionen in das Koordinatensystem ein.

Geg:  $y_1 = \frac{1}{4}x^2 + 2x - 3$ ,  $y_2 = \frac{1}{2}x + 1$

Ges: a.  $N_1$  u.  $N_2 : y_1(x) = 0$ ,  $N_3 : y_2(x) = 0$

b.  $S = ?$

c.  $A = ?$ ,  $B = ?$  (wenn  $y_1 = y_2$ )


Lösung:

a.  $y_1 = \frac{1}{4}x^2 + 2x - 3 = 0 \quad | \cdot 4$   
 $x^2 + 8x - 12 = 0$   
 $x_{1,2} = \frac{-8 \pm \sqrt{8^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-12)}}{2} = \frac{-8 \pm \sqrt{112}}{2}$   
 $x_1 = \underline{1.2915} \quad \vee \quad x_2 = \underline{-9.2915} \quad \underline{N_1(1.2915; 0)}, \quad \underline{N_2(-9.2915; 0)}$   
 $y_2 = \frac{1}{2}x + 1 = 0 \rightarrow \frac{1}{2}x = -1$   
 $x = \underline{-2} \quad \underline{N_3(-2; 0)}$

b.  $x_s = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{1.2915 - 9.2915}{2} = \underline{-4}$   
 $y_s = y_1(x_s) = \frac{1}{4}(-4)^2 + 2(-4) - 3 = \underline{-7} \quad \underline{S(-4; -7)}$

c.  $y_1 = y_2 \rightarrow \frac{1}{4}x^2 + 2x - 3 = \frac{1}{2}x + 1 \quad | \cdot 4$   
 $x^2 + 8x - 12 = 2x + 4 \quad | -2x \quad | -4$   
 $x^2 + 6x - 16 = 0 = (x + 8) \cdot (x - 2)$   
 $x_1 = \underline{-8} \quad \vee \quad x_2 = \underline{2} \quad \underline{A(-8; -3)}, \quad \underline{B(2; 2)}$

Koordinatensystem für Aufgabe 1:



**15.2 Scheitelform einer Parabel ist durch drei Punkte bestimmt (A,  $x_s$  und  $y_s$ )**

2. Berechnen Sie  $x_s$  und  $y_s$  so, dass der Graph von  $y = (x - x_s)^2 + y_s$  durch die Punkte P (-3 | 5) und Q (5 | 5) geht.

Variante 1 mit Gleichungssystem, P bzw. Q in Scheitelform einsetzen:

Geg:  $P(-3|5)$ ,  $Q(5|5)$ ,  $y = (x - x_s)^2 + y_s$

Ges:  $x_s = ?$ ,  $y_s = ?$

Lösung:

P eingesetzt:  $5 = (-3 - x_s)^2 + y_s \rightarrow 5 = 9 + 6x_s + x_s^2 + y_s$  (1)

Q eingesetzt:  $5 = (5 - x_s)^2 + y_s \rightarrow 5 = 25 - 10x_s + x_s^2 + y_s$  (2)

(1)  $\cdot (-1)$ :  $-5 = -9 - 6x_s - x_s^2 - y_s$  (1a)

(2):  $5 = 25 - 10x_s + x_s^2 + y_s$

(1a)+(2):  $0 = 16 - 16x_s$

damit:  $x_s = \underline{1}$  (3)

(3) in (1):  $5 = (-3 - 1)^2 + y_s$

$$5 = 16 + y_s$$

damit:  $y_s = \underline{\underline{-11}}$

und:  $y = \underline{\underline{(x - 1)^2 - 11}}$

Variante 2 mit Ausnutzung der Symmetrie  $P(y) = Q(y)$ :

Geg:  $P(-3|5)$ ,  $Q(5|5)$ ,  $y = (x - x_s)^2 + y_s$

Ges:  $x_s = ?$ ,  $y_s = ?$

Lösung:


Sehr eleganter Lösungsweg, Prinzip muss aber zuerst erkannt werden.

$x_s$  muss in der Mitte der x-Koordinate von P und Q liegen (wegen Symmetrie).

damit:  $x_s = \frac{P_x + Q_x}{2} = \frac{-3 + 5}{2} = 1$

Q u.  $x_s$  einsetzen:  $5 = [5 - 1]^2 + y_s$


somit:  $y_s = 5 - 16 = \underline{\underline{-11}}$  und  $y = \underline{\underline{(x - 1)^2 - 11}}$





### 15.3 Eine Parabel ist durch 3 Punkte bestimmt (A, B und C)

3. Gemäss einem Testbericht in der Automobil Revue zeigt der Personenwagen Nissan Primera die untenstehende Abhängigkeit des Benzinverbrauches  $y$  von der Geschwindigkeit  $x$ . Die fünf Messungen ergeben einen Graphen, der dem Ausschnitt aus einer Parabel ähnlich sieht. Verwenden Sie die Punkte  $P_1(60;5)$ ,  $P_2(100;6.4)$ ,  $P_3(140;9.2)$  und bestimmen Sie die Funktionsgleichung  $y = Ax^2 + Bx + C$  der Parabel, welche durch diese drei Punkte verläuft.



**Hinweis:** Das Gleichungssystem kann natürlich mit dem TI gelöst werden!

Geg:  $P_1(60|5)$ ,  $P_2(100|6.4)$ ,  $P_3(140|9.2)$

Ges:  $A = ?$ ,  $B = ?$ ,  $C = ?$

Lösung:

Ansatz:  $y = Ax^2 + Bx + C$  (1)

die drei Punkte in die Gleichung (1) eingesetzt:

$$P_1 \left( \begin{array}{c|c} 60 & 5.0 \\ \hline x & y \end{array} \right): 5.0 = A \cdot 60^2 + B \cdot 60 + C \quad (2)$$

$$P_2 \left( \begin{array}{c|c} 100 & 6.4 \\ \hline x & y \end{array} \right): 6.4 = A \cdot 100^2 + B \cdot 100 + C \quad (3)$$

$$P_3 \left( \begin{array}{c|c} 140 & 9.2 \\ \hline x & y \end{array} \right): 9.2 = A \cdot 140^2 + B \cdot 140 + C \quad (4)$$

C ersetzen aus (2) und (3), durch Gleichsetzen  $C = C$ :

$$\underbrace{5.0 - 3'600A - 60B}_C = \underbrace{6.4 - 10'000A - 100B}_C$$

$$6'400A + 40B = 1.4 \quad (5)$$

C ersetzen aus (3) und (4), durch Gleichsetzen  $C = C$ :

$$\underbrace{6.4 - 10'000A - 100B}_C = \underbrace{9.2 - 19'600A - 140B}_C$$

$$9'600A + 40B = 2.8 \quad (6)$$

B ersetzen aus (5) und (6), durch Additionsverfahren:

$$(6): \quad 9'600A + 40B = 2.8$$

$$(5a): \quad \underline{-6'400A - 40B = -1.4} \quad (5) \text{ mit } -1 \text{ multipliziert}$$

$$3'200a = 1.4$$

$$A = \frac{1.4}{3'200} = \frac{7}{16'000} = \underline{0.0004375} \quad (7)$$

$$(7) \text{ in } (5): \quad 40B = 1.4 - 6'400A$$

$$B = \frac{1.4 - 6'400A}{40} = -\frac{7}{200} = \underline{-0.035} \quad (8)$$

$$(7 \text{ u. } 8) \text{ in } (2): \quad C = 5.0 - 3'600A - 60B = \frac{221}{40} = \underline{5.525}$$

$$\text{somit:} \quad y = \underline{0.0004375x^2 - 0.035x + 5.525}$$

**Kontrolle:** Einsetzen der drei Punkte in die berechnete Funktionsgleichung!

### 15.4 Schnittpunkte von Funktionen

4. Gegeben sind die Parabel  $y = -x^2 + 4x + 5$  und die Gerade  $y = 2x + 1$ . Bestimmen Sie:
- den Scheitelpunkt S der Parabel.
  - die Schnittpunkte A und B der Parabel mit der Geraden.
  - den y-Achsenabschnitt b der Geraden  $y = 2x + b$  so, dass die Gerade die Parabel berührt. Wie heißen die Koordinaten des Berührungspunktes C?
  - Zeichnen Sie die Graphen in das folgende Koordinatensystem ein.

Geg:  $y_1 = -x^2 + 4x + 5$ ,  $y_2 = 2x + 1$

Ges:  $S = ?$ ,  $A = ?$ ,  $B = ?$ ,  $y_3 = 2x + \mathbf{b}$ ,  $C = ?$

Lösung:

- a) Berechnung Scheitelform:

$$y_1 = -(x^2 - 4x - 5) = -(x^2 - 4x + 2^2 - 2^2 - 5) = -[(x - 2)^2 - 9] = \underline{-(x - 2)^2 + 9}$$

somit: S(2|9)

- b) Schnittpunkte A und B  $\rightarrow y_1(x) = y_2(x)$

$$-x^2 + 4x + 5 = 2x + 1$$

$$|-2x \quad |-1$$

$$-x^2 + 2x + 4 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 4}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{-2}$$

$$x_1 = \underline{-1.24} \text{ oder } x_2 = \underline{3.24}$$

$$y(x_1) = 2x_1 + 1 = \underline{-1.47} \text{ und } y(x_2) = 2x_2 + 1 = \underline{7.47}$$

somit: Punkt A(-1.24|-1.47) und Punkt B(3.24|7.47)

- c) Ansatz:  $y_1(x) = y_3(x)$  und **Diskriminante = 0**

$$-x^2 + 4x + 5 = 2x + b \rightarrow -x^2 + 2x + 5 - b = 0$$

$$\sqrt{B^2 - 4AC} = 0 \rightarrow \sqrt{2^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (5 - b)} = 0$$

$$\sqrt{2^2 + 4 \cdot (5 - b)} = \sqrt{2^2 + 20 - 4b} = \sqrt{24 - 4b} = 0$$

$$24 - 4b = 0 \rightarrow 4b = 24 \rightarrow b = \underline{6}$$

somit: Der y-Achsenabschnitt b muss 6 sein,  $y_3(x) = 2x + 6!$


Ansatz für Berührungspunkt C:  $y_1(x) = y_3(x)$  und **Diskriminante = 0**

$$-x^2 + 4x + 5 = 2x + 6 \rightarrow -x^2 + 2x - 1 = 0$$

$$x_1 = x_2 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \frac{-2 \pm 0}{2A} = \frac{-2}{-2} = 1 \rightarrow y_3(1) = 2x + 6 = \underline{8}$$

somit: Der Berührungspunkt C hat die Koordinaten (1|8)

Koordinatensystem für Aufgabe 4:



5. Eine Parabel geht durch den Ursprung des Koordinatensystems. Der zweite Schnittpunkt der Parabel mit der x-Achse, sowie der Scheitelpunkt liegen auf der Geraden  $y = -3x + 24$ .
- Berechnen Sie die 2. Nullstelle und die Koordinaten des Scheitels der Parabel.
  - Wie heisst die Funktionsgleichung der Parabel?
  - Stellen Sie die Gerade und die Parabel graphisch dar (K-System auf nächster Seite).

Geg:  $y_1 = -3x + 24$ ,  $N_1 = (0|0)$ ,  $S, N_2 \in y_1$

Ges:  $N_2 = ?$ ,  $S = ?$ ,  $y_2 = A \cdot (x - x_s)^2 + y_s$

Lösung:

- a) Berechnung der zweiten Nullstelle:

$$y_1 = 0 = -3x + 24 \rightarrow 3x = 24 \rightarrow x = 8$$

somit:  $N_2(8|0)$

Berechnung von S:

$$x_s = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{8 + 0}{2} = 4 \rightarrow y_s = y_1(4) = -3 \cdot 4 + 24 = 12$$

somit:  $S(4|12)$

- b) Berechnung von  $y_2 = A \cdot (x - x_s)^2 + y_s \rightarrow S(4|12)$  und  $N_2(8|0)$  einsetzen:

$$0 = A \cdot (8 - 4)^2 + 12 \rightarrow 0 = 16 \cdot A + 12 \rightarrow A = -\frac{12}{16} = -\frac{3}{4}$$

somit:  $y_2 = -\frac{3}{4} \cdot (x - 4)^2 + 12 = -\frac{3}{4} \cdot (x^2 - 8x + 16) + 12$

$$y_2 = -\frac{3}{4}x^2 + 6x$$

- b) Bestimmung von Streckfaktor A (anschauliche Variante):


aus Graph ersichtlich:  $\Delta x = -4$  und  $\Delta y = -12$

damit:  $\Delta y = A \cdot \Delta x^2 \rightarrow A = \frac{\Delta y}{\Delta x^2} = \frac{-12}{(-4)^2} = -\frac{3}{4}$

somit:  $y_2 = -\frac{3}{4} \cdot (x - 4)^2 + 12 = -\frac{3}{4} \cdot (x^2 - 8x + 16) + 12$

$$y_2 = -\frac{3}{4}x^2 + 6x$$

Koordinatensystem für Aufgabe 5:



6. Die quadratische Funktion  $y = Ax^2 + Bx + 3$  ( $x, A, B \in \mathbf{R}$ ) besitzt den Scheitelpunkt  $S(1; y_S)$  und es gilt  $y(4) = -5$ .
- Berechnen Sie  $A, B$  und  $y_S$ . Bestimmen Sie anschliessend die Nullstellen und skizzieren Sie den Graphen (K-System folgt auf den nächsten Seiten).
  - Wie lautet die Gleichung der Geraden, welche durch den Scheitelpunkt  $S$  und die grössere der beiden Nullstellen geht?

Geg:  $y_1 = Ax^2 + Bx + 3$ ,  $x_S = 1$ ,  $P_1(4|-5)$ ,  $P_2(0|3) \rightarrow C = 3$

Ges:  $A = ?$ ,  $B = ?$ ,  $y_S = ?$ ,  $N_1 = ?$ ,  $N_2 = ?$ ,  $y_2 = ?$

Lösung:

- a)  $P_1(4|-5)$  und  $P_2(0|3)$  und  $x_S = 1$  in Scheitelform  $y = A(x - x_S)^2 + y_S$  einsetzen:

$$-5 = A(4 - 1)^2 + y_S = 9A + y_S \quad (1)$$

$$3 = A(0 - 1)^2 + y_S = 1A + y_S \quad (2)$$

$$(1): \quad \underline{-5 = 9A + y_S} \quad (1)$$

$$(2) \cdot (-1): \quad \underline{-3 = -1A - y_S} \quad (2a)$$

$$(1) + (2a): \quad \underline{-8 = 8A} \quad \rightarrow A = \underline{-1} \quad (3)$$

$$(3) \text{ in } (2): \quad 3 = -1 + y_S \quad \rightarrow y_S = \underline{4}$$

somit:  $y = -1(x - 1)^2 + 4$

$$y = -1(x^2 - 2x + 1) + 4 = -x^2 + 2x - 1 + 4$$

$$y = \underline{\underline{-x^2 + 2x + 3}}$$

Nullstellen berechnen:

$$y = -\left(x^2 - 2x \underset{-3}{-3}\right) = \underline{\underline{-(x+1)(x-3)}}$$

somit:  $\underline{\underline{N_1(-1|0)}}$   $\vee$   $\underline{\underline{N_2(3|0)}}$

- b) Berechnung von  $y_2$ :

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-4}{2} = \underline{\underline{-2}}$$

$$S(1|4) \text{ in } y_2 \text{ einsetzen: } b = 4 - (-2) \cdot 1 = \underline{\underline{6}}$$

somit:  $y_2 = \underline{\underline{-2x + 6}}$

Variante über ABC-Form:

Geg:  $y_1 = Ax^2 + Bx + 3$ ,  $x_s = 1$ ,  $P_1(4|-5)$ ,  $P_2(0|3)$  → wegen Symmetrie zu  $x_s$ :  $P_3(-2|-5)$

Ges:  $A = ?$ ,  $B = ?$ ,  $y_s = ?$ ,  $N_1 = ?$ ,  $N_2 = ?$ ,  $y_2 = ?$

Lösung:

a) Berechnung von A und B:

$$P_1(4|-5) \text{ eingesetzt: } -5 = 16 \cdot A + 4 \cdot B + 3 \quad (1)$$

$$P_3(-2|-5) \text{ eingesetzt: } -5 = 4 \cdot A - 2 \cdot B + 3 \quad (2)$$

$$\text{Gleichung(2)} \cdot 2: -10 = 8 \cdot A - 4 \cdot B + 6 \quad (2a)$$

$$(1) + (2a): -15 = 24A + 9$$

$$\text{damit: } A = \frac{-24}{24} = -1 \quad (3)$$

$$(3) \text{ in } (1): -5 = -16 + 4 \cdot B + 3$$

$$\text{damit: } B = \frac{-5 + 16 - 3}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

$$\text{somit: } y_1 = \underline{\underline{-x^2 + 2x + 3}}$$

$$y_s \text{ berechnen: } y_s = y_1(x_s) = -1^2 + 2 \cdot 1 + 3 = 4$$

$$\text{somit: } \underline{\underline{S(1|4)}}$$

$$\text{Nullstellen berechnen: } y = -\left(x^2 - 2x \underset{-3}{-3}\right) = \underline{\underline{-(x+1)(x-3)}}$$

$$\text{somit: } \underline{\underline{N_1(-1|0)}} \quad \vee \quad \underline{\underline{N_2(3|0)}}$$

$$\text{b) Berechnung von } y_2: m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$S(1|4) \text{ in } y_2 \text{ einsetzen: } b = 4 - (-2) \cdot 1 = 6$$

$$\text{somit: } y_2 = \underline{\underline{-2x + 6}}$$



Zweite Variante über die Scheitelform (kompliziert):

Lösung:

a) Scheitelform berechnen:

$$y_1 = Ax^2 + Bx + 3 \quad (0)$$

$$y_1 = A \left( x^2 + \frac{B}{A}x + \frac{3}{A} \right)$$

$$y_1 = A \cdot \left[ x^2 + \frac{B}{A}x + \left( \frac{B}{2A} \right)^2 - \left( \frac{B}{2A} \right)^2 + \frac{3}{A} \right]$$

$$y_1 = A \cdot \left[ \left( x + \frac{B}{2A} \right)^2 - \frac{B^2}{4A^2} + \frac{3}{A} \right] = A \cdot \left[ \left( x + \frac{B}{2A} \right)^2 - \frac{B^2}{4A^2} + \frac{12A}{4A^2} \right]$$

$$y_1 = A \cdot \left[ \left( x + \frac{B}{2A} \right)^2 + \frac{12A - B^2}{4A^2} \right] = A \cdot \left( \underbrace{x + \frac{B}{2A}}_{-x_S} \right)^2 + \frac{12A - B^2}{4A}$$

damit:  $\frac{B}{2A} = -1 \rightarrow B = -2A \quad (1)$

$P_1(4|-5)$  u. (1) in (0):

$$\begin{aligned} -5 &= A \cdot 4^2 + (-2A) \cdot 4 + 3 \\ -5 &= 16A - 8A + 3 \\ A &= \frac{-5-3}{8} = \underline{-1} \end{aligned} \quad (2)$$

(2) in (1):  $B = -2A = -2 \cdot (-1) = \underline{2}$

somit:  $y_1 = \underline{\underline{-x^2 + 2x + 3}}$

Koordinatensystem für Aufgabe 6:

